SVTPT FSPA FSFA FSFB
SCHWEIZERISCHER VERBAND FÜR TIERPHYSIOTHERAPIE
FÉDÉRATION SUISSE DE PHYSIOTHÉRAPIE POUR ANIMAUX
FEDERAZIONE SVIZZERA DELLA FISIOTERAPIA PER ANIMALI
FEDERAZIUN SVIZRA DELLA FISIOTERAPIA PER BES-CHAS

Kreuzbandruptur Hund – Operation - Technik TTA (Tibial Tuberosity Advancement)

Teil - osteotomie der Tibia um die Platte einzupassen


Einpassen der Platte


Platte ist proximal bereits fixiert.
Nun kann die Osteotomie vollständig
ausgeführt werden und der
Teil der Tibia abgespreizt werden um
den Abstandhalter einzufügen
stryker

eingefügter Abstandhalter
und gut sitzende Platte:
wichtig ist, dass die Platte
distal noch gut auf die Tibia
zu liegen kommt


Fixieren der Platte distal und gleichzeitig
fixieren der 2 Tibiateile:
Beim Bohren ist essentiell,
dass der Knochen gekühlt wird,
damit keine Verbrennungen entstehen


eindrehen der Schrauben
in die Platte distal


fixierte Platte und Abstandhalter
nun wird der Spalt noch mit
Spongiosa aufgefüllt

Nähen / Verschliessen der Faszie, die geschnitten werden musste um Zugang zum Knochen zu haben. Dieser Schritt ist enorm wichtig für eine gute funktionelle Regeneration. Wird die Faszie nicht einzeln verschlossen, kann es zu Nahtdehiszenz kommen durch zuviel Spannung

Verschluss der inneren
Hautschichten

innerer Verschluss mit
selbstauflösenden Fäden

abschliessende Hautnaht mit Fäden,
die 10 Tage nach OP gezogen werden